



**Gebrauchsinformation:
Information für den Anwender**

GALLENTEE M BOMBASTUS®

2 g / Aufgussbeutel

Arzneitee zum Einnehmen
nach Bereitung eines Teeaufgusses

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Gallentee M Bombastus® und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Gallentee M Bombastus® beachten?
3. Wie ist Gallentee M Bombastus® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gallentee M Bombastus® aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Gallentee M Bombastus® und wofür wird er angewendet?

Gallentee M Bombastus® ist ein pflanzliches Gallenmittel.

Dieser Arzneitee wird zur Unterstützung bei der Behandlung von nichtentzündlichen Gallenblasenbeschwerden und bei Störungen im Bereich des Gallenabflusses, Beschwerden im Bereich von Magen und Darm wie Völlegefühl, Blähungen und Verdauungsbeschwerden angewendet.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Gallentee M Bombastus® beachten?

Gallentee M Bombastus® darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Löwenzahn, Javanische Gelbwurz, Mariendistelfrüchte, Pfefferminzblätter, Kümmel, Birke, Beifuß, Menthol sowie andere Korbblütler (z. B. Arnika, Ringelblumen, Schafgarbe) oder Doldenblütler (z. B. Fenchel, Anis, Sellerie, Koriander, Dill) sind,
- bei Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege, Gallensteinen oder sonstigen Gallenerkrankungen,
- bei Lebererkrankungen,
- bei Magengeschwüren,
- bei Darmverschluss.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Gallentee M Bombastus® ist erforderlich, wenn die unter Abschnitt 1 beschriebenen Beschwerden verstärkt auftreten.

Fragen Sie in diesem Fall Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Anwendung bei Patienten mit Niereninsuffizienz, Diabetes und/oder Herzinsuffizienz sollte aufgrund der möglichen Gefahr einer Hyperkalämie vermieden werden.

Arzneimittel, die Pfefferminzblätter enthalten, können bereits bestehendes Sodbrennen verstärken.

Bei Gelbsucht oder bei ungewöhnlichen Verfärbungen von Urin oder Stuhl ist ein Arzt aufzusuchen.

Teeaufgüsse sollen grundsätzlich mit kochendem Wasser zubereitet werden. Eine Zubereitung von Tee mit warmem Wasser ist nicht ausreichend.

Kinder und Jugendliche

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen, um gegebenenfalls andere zugrunde liegende Erkrankungen auszuschließen.

Anwendung von Gallentee M Bombastus® zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Wechselwirkungen sind keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Zur Anwendung von Gallentee M Bombastus® in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bisher liegen keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Verkehrsfähigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor. Entsprechende Untersuchungen wurden mit Gallentee M Bombastus® nicht durchgeführt.

3. Wie ist Gallentee M Bombastus® anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, wird 3- bis 4-mal täglich

1 Tasse frisch bereiteter Tee ½ Stunde vor den Mahlzeiten getrunken.

2 Aufgussbeutel Gallentee M Bombastus® werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und bedeckt etwa 10 bis 15 Minuten ziehen gelassen.

Dauer der Anwendung

Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt. Bei akuten Beschwerden, die länger als 2 Wochen andauern oder periodisch wiederkehren, wird die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge Gallentee M Bombastus® angewendet haben, als Sie sollten

und sich aufgrund der höheren Dosis Beschwerden einstellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Leichte Verdauungsbeschwerden wie trockener Mund, Blähungen, Magenverstimmung, Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Durchfall sowie allergische Reaktionen können auftreten. Vorhandenes Sodbrennen kann verstärkt werden. Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Gallentee M Bombastus® aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen. Nicht über 25 °C lagern.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Gallentee M Bombastus® enthält

1 Aufgussbeutel (=2 g) Arzneitee enthält die Wirkstoffe: 0,6 g Löwenzahn, 0,4 g Javanische Gelbwurz, 0,4 g Mariendistelfrüchte, 0,4 g Pfefferminzblätter, 0,2 g Kümmel. Sonstige Bestandteile sind nicht enthalten.

Wie Gallentee M Bombastus® aussieht und Inhalt der Packung

Originalpackung mit 20 einzeln verpackten Filterbeuteln à 2 g. Gallentee M Bombastus® ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:

- 100 g Arzneitee im Umkarton
- 40 g Arzneitee à 2 g (20 Aufgussbeutel)

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Bombastus-Werke AG
Wilsdruffer Straße 170
01705 Freital
Deutschland

Telefon: +49 351 65803-0

Fax: +49 351 65803-99

E-Mail: info@bombastus-werke.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2024.